

**КЛЕЩЕВОЙ ВИРУСНЫЙ ЭНЦЕФАЛИТ - ОСТРОЕ ИНФЕКЦИОННОЕ ВИРУСНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ, последствиями заболевания могут быть нарушения здоровья, приводящие к инвалидности и смерти.**

**ОСОБЕННО ОПАСНО ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА!**

**Пути заражения**

**1. При укусе клеща, зараженного вирусом**



**2. При втирании в кожу вируса в случае расчесывания мест укуса клеща**

**3. При употреблении сырого молока и продуктов из него коз и коров, у которых вирус может находиться в молоке**



**ПРЕДУПРЕДИТЬ ЗАБОЛЕВАНИЕ  
МОЖНО С ПОМОЩЬЮ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК**

**ВСЕ выезжающие  
на неблагополучные по клещевому вирусному энцефалиту  
территории\* должны быть привиты:**



- ✓ вакцинацию необходимо начинать за 1,5 месяца до выезда на неблагополучную территорию;
- ✓ прививка состоит из 2-х инъекций, после последней инъекции должно пройти не менее 14 дней до выезда в очаг;
- ✓ ревакцинация (состоит из 1-й инъекции) проводится через 1 год и далее – каждые 3 года

\* Перечень административных территорий субъектов Российской Федерации, эндемичных по клещевому вирусному энцефалиту, размещен на сайте Управления Роспотребнадзора по г. Москве <http://77.rospotrebnadzor.ru>